

表 807 心筋梗塞の既往 透析前拡張期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前拡張 期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	5	1	6		1	7
(%)	(83.3)	(16.7)	(100.0)			
20～	77	17	94		27	121
(%)	(81.9)	(18.1)	(100.0)			
40～	1,947	352	2,299	4	377	2,680
(%)	(84.7)	(15.3)	(100.0)			
60～	10,924	1,497	12,421	32	2,519	14,972
(%)	(87.9)	(12.1)	(100.0)			
80～	6,768	704	7,472	11	1,520	9,003
(%)	(90.6)	(9.4)	(100.0)			
90～	4,077	333	4,410	7	900	5,317
(%)	(92.4)	(7.6)	(100.0)			
100～	2,107	155	2,262	3	436	2,701
(%)	(93.1)	(6.9)	(100.0)			
120～	136	3	139		30	169
(%)	(97.8)	(2.2)	(100.0)			
140～	10	2	12			12
(%)	(83.3)	(16.7)	(100.0)			
合計	26,051	3,064	29,115	57	5,810	34,982
(%)	(89.5)	(10.5)	(100.0)			
記載なし	3,109	426	3,535	15	1,414	4,964
(%)	(87.9)	(12.1)	(100.0)			
総計	29,160	3,490	32,650	72	7,224	39,946
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			
平均	79.53	75.58	79.11	76.81	79.49	79.17
標準偏差	14.72	14.55	14.75	13.20	14.45	14.70

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査