

表 808 心筋梗塞の既往 透析前脈拍(拍/分)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前脈拍	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
40未満	10	4	14		3	17
(%)	(71.4)	(28.6)	(100.0)			
40～	225	32	257		38	295
(%)	(87.5)	(12.5)	(100.0)			
50～	1,949	232	2,181	6	445	2,632
(%)	(89.4)	(10.6)	(100.0)			
60～	6,254	793	7,047	16	1,427	8,490
(%)	(88.7)	(11.3)	(100.0)			
70～	7,864	889	8,753	19	1,773	10,545
(%)	(89.8)	(10.2)	(100.0)			
80～	5,213	606	5,819	8	1,236	7,063
(%)	(89.6)	(10.4)	(100.0)			
90～	2,439	271	2,710	7	576	3,293
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
100～	773	98	871		171	1,042
(%)	(88.7)	(11.3)	(100.0)			
110～	201	24	225		36	261
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			
120～	86	9	95		11	106
(%)	(90.5)	(9.5)	(100.0)			
合計	25,014	2,958	27,972	56	5,716	33,744
(%)	(89.4)	(10.6)	(100.0)			
記載なし	4,146	532	4,678	16	1,508	6,202
(%)	(88.6)	(11.4)	(100.0)			
総計	29,160	3,490	32,650	72	7,224	39,946
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			
平均	75.47	74.98	75.42	74.05	75.49	75.43
標準偏差	12.99	13.08	13.00	11.99	12.63	12.93

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査