

表 821 心筋梗塞の既往 身長(cm)別（腹膜透析患者）

身長	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
130未満	57	1	58		4	62
(%)	(98.3)	(1.7)	(100.0)			
130～	8	2	10		1	11
(%)	(80.0)	(20.0)	(100.0)			
135～	53	3	56		6	62
(%)	(94.6)	(5.4)	(100.0)			
140～	171	15	186	3	38	227
(%)	(91.9)	(8.1)	(100.0)			
145～	347	30	377	3	90	470
(%)	(92.0)	(8.0)	(100.0)			
150～	657	43	700	5	162	867
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
155～	791	80	871	6	172	1,049
(%)	(90.8)	(9.2)	(100.0)			
160～	967	107	1,074	8	248	1,330
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
165～	892	98	990	9	213	1,212
(%)	(90.1)	(9.9)	(100.0)			
170～	666	56	722	9	173	904
(%)	(92.2)	(7.8)	(100.0)			
175～	267	37	304	4	58	366
(%)	(87.8)	(12.2)	(100.0)			
180～	67	4	71		16	87
(%)	(94.4)	(5.6)	(100.0)			
185～	11	1	12		1	13
(%)	(91.7)	(8.3)	(100.0)			
190～	3		3		1	4
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	4,957	477	5,434	47	1,183	6,664
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
記載なし	403	40	443	19	1,815	2,277
(%)	(91.0)	(9.0)	(100.0)			
総計	5,360	517	5,877	66	2,998	8,941
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
平均	160.34	161.75	160.46	162.15	160.91	160.56
標準偏差	11.97	9.69	11.79	10.03	10.69	11.59

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査