

表 822 心筋梗塞の既往 体重(kg)別（腹膜透析患者）

体重	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	38		38			38
(%)	(100.0)		(100.0)			
20～	22		22		1	23
(%)	(100.0)		(100.0)			
30～	149	8	157	1	14	172
(%)	(94.9)	(5.1)	(100.0)			
40～	752	55	807	9	88	904
(%)	(93.2)	(6.8)	(100.0)			
50～	1,289	121	1,410	11	170	1,591
(%)	(91.4)	(8.6)	(100.0)			
60～	1,308	130	1,438	9	169	1,616
(%)	(91.0)	(9.0)	(100.0)			
70～	654	56	710	8	93	811
(%)	(92.1)	(7.9)	(100.0)			
80～	239	23	262	7	29	298
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
90～	74	13	87	1	16	104
(%)	(85.1)	(14.9)	(100.0)			
100～	16		16	1	3	20
(%)	(100.0)		(100.0)			
110～	8		8		2	10
(%)	(100.0)		(100.0)			
120～	9		9			9
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	4,558	406	4,964	47	585	5,596
(%)	(91.8)	(8.2)	(100.0)			
記載なし	802	111	913	19	2,413	3,345
(%)	(87.8)	(12.2)	(100.0)			
総計	5,360	517	5,877	66	2,998	8,941
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
平均	60.43	62.05	60.57	64.68	61.94	60.74
標準偏差	14.07	12.59	13.96	15.20	13.13	13.90

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査