

表 823 心筋梗塞の既往 Body Mass Index別（腹膜透析患者）

Body Mass Index	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
14未満	24		24		3	27
(%)	(100.0)		(100.0)			
14～	63	3	66	1	4	71
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
16～	201	14	215		13	228
(%)	(93.5)	(6.5)	(100.0)			
18～	526	40	566	3	58	627
(%)	(92.9)	(7.1)	(100.0)			
20～	949	85	1,034	8	98	1,140
(%)	(91.8)	(8.2)	(100.0)			
22～	1,012	98	1,110	5	146	1,261
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
24～	747	72	819	11	78	908
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
26～	460	45	505	6	50	561
(%)	(91.1)	(8.9)	(100.0)			
28～	246	21	267	5	30	302
(%)	(92.1)	(7.9)	(100.0)			
30～	179	13	192	3	25	220
(%)	(93.2)	(6.8)	(100.0)			
合計	4,407	391	4,798	42	505	5,345
(%)	(91.9)	(8.1)	(100.0)			
記載なし	953	126	1,079	24	2,493	3,596
(%)	(88.3)	(11.7)	(100.0)			
総計	5,360	517	5,877	66	2,998	8,941
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
平均	23.09	23.37	23.11	24.66	23.32	23.15
標準偏差	3.62	3.32	3.60	3.91	3.52	3.60

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査