

表 824 心筋梗塞の既往 BUN(mg/dL)別（腹膜透析患者）

BUN	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	18	5	23		6	29
(%)	(78.3)	(21.7)	(100.0)			
20～	159	15	174	1	8	183
(%)	(91.4)	(8.6)	(100.0)			
30～	525	63	588	8	76	672
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			
40～	1,076	113	1,189	10	193	1,392
(%)	(90.5)	(9.5)	(100.0)			
50～	1,273	108	1,381	13	219	1,613
(%)	(92.2)	(7.8)	(100.0)			
60～	909	72	981	8	161	1,150
(%)	(92.7)	(7.3)	(100.0)			
70～	452	29	481	1	67	549
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
80～	192	17	209	5	31	245
(%)	(91.9)	(8.1)	(100.0)			
90～	73	5	78		11	89
(%)	(93.6)	(6.4)	(100.0)			
100～	27	3	30	1	9	40
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
110～	7		7			7
(%)	(100.0)		(100.0)			
120～	5	1	6		1	7
(%)	(83.3)	(16.7)	(100.0)			
合計	4,716	431	5,147	47	782	5,976
(%)	(91.6)	(8.4)	(100.0)			
記載なし	644	86	730	19	2,216	2,965
(%)	(88.2)	(11.8)	(100.0)			
総計	5,360	517	5,877	66	2,998	8,941
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
平均	54.97	52.74	54.78	55.49	55.68	54.90
標準偏差	15.93	15.99	15.94	16.12	14.99	15.82

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査