

表 825 心筋梗塞の既往 クレアチニン濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

クレアチニン 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	14 (93.3)	1 (6.7)	15 (100.0)		2	17
2～ (%)	111 (83.5)	22 (16.5)	133 (100.0)		21	154
4～ (%)	451 (87.6)	64 (12.4)	515 (100.0)	6	54	575
6～ (%)	915 (92.1)	79 (7.9)	994 (100.0)	8	131	1,133
8～ (%)	1,084 (92.1)	93 (7.9)	1,177 (100.0)	12	160	1,349
10～ (%)	862 (91.6)	79 (8.4)	941 (100.0)	9	165	1,115
12～ (%)	670 (93.1)	50 (6.9)	720 (100.0)	7	121	848
14～ (%)	378 (93.1)	28 (6.9)	406 (100.0)	4	78	488
16～ (%)	230 (93.9)	15 (6.1)	245 (100.0)	1	49	295
合計 (%)	4,715 (91.6)	431 (8.4)	5,146 (100.0)	47	781	5,974
記載なし (%)	645 (88.2)	86 (11.8)	731 (100.0)	19	2,217	2,967
総計 (%)	5,360 (91.2)	517 (8.8)	5,877 (100.0)	66	2,998	8,941
平均	9.87	9.26	9.82	9.71	10.33	9.89
標準偏差	3.49	3.92	3.53	3.00	3.53	3.53

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査