

表 826 心筋梗塞の既往 アルブミン濃度(g/dL)別 (腹膜透析患者)

アルブミン 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	11 (84.6)	2 (15.4)	13 (100.0)		2	15
1.5～ (%)	51 (83.6)	10 (16.4)	61 (100.0)		10	71
2.0～ (%)	241 (91.3)	23 (8.7)	264 (100.0)	1	33	298
2.5～ (%)	786 (89.2)	95 (10.8)	881 (100.0)	11	145	1,037
3.0～ (%)	1,716 (92.4)	141 (7.6)	1,857 (100.0)	17	284	2,158
3.5～ (%)	1,515 (92.3)	127 (7.7)	1,642 (100.0)	14	250	1,906
4.0～ (%)	343 (92.0)	30 (8.0)	373 (100.0)	3	55	431
4.5～ (%)	17 (94.4)	1 (5.6)	18 (100.0)	1	2	21
5.0～ (%)	2 (100.0)		2 (100.0)			2
合計 (%)	4,682 (91.6)	429 (8.4)	5,111 (100.0)	47	781	5,939
記載なし (%)	678 (88.5)	88 (11.5)	766 (100.0)	19	2,217	3,002
総計 (%)	5,360 (91.2)	517 (8.8)	5,877 (100.0)	66	2,998	8,941
平均	3.28	3.21	3.28	3.31	3.27	3.28
標準偏差	0.52	0.55	0.52	0.50	0.52	0.52

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査