

表 827 心筋梗塞の既往 CRP濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

CRP濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	2,459 (92.9)	189 (7.1)	2,648 (100.0)	26	393	3,067
0.2～ (%)	772 (91.0)	76 (9.0)	848 (100.0)	8	139	995
0.5～ (%)	340 (88.1)	46 (11.9)	386 (100.0)	5	58	449
1.0～ (%)	230 (88.1)	31 (11.9)	261 (100.0)	2	45	308
2.0～ (%)	153 (86.4)	24 (13.6)	177 (100.0)	4	21	202
4.0～ (%)	67 (91.8)	6 (8.2)	73 (100.0)	1	9	83
6.0～ (%)	28 (80.0)	7 (20.0)	35 (100.0)		5	40
8.0～ (%)	19 (86.4)	3 (13.6)	22 (100.0)		2	24
10.0～ (%)	30 (90.9)	3 (9.1)	33 (100.0)		1	34
15.0～ (%)	5 (71.4)	2 (28.6)	7 (100.0)			7
合計 (%)	4,103 (91.4)	387 (8.6)	4,490 (100.0)	46	673	5,209
記載なし (%)	1,257 (90.6)	130 (9.4)	1,387 (100.0)	20	2,325	3,732
総計 (%)	5,360 (91.2)	517 (8.8)	5,877 (100.0)	66	2,998	8,941
平均	0.62	0.96	0.65	0.61	0.50	0.63
標準偏差	1.68	2.66	1.79	1.19	1.11	1.71

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査