

表 828 心筋梗塞の既往 補正カルシウム濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

補正 カルシウム濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	23 (100.0)		23 (100.0)		6	29
7.0～ (%)	29 (93.5)	2 (6.5)	31 (100.0)		5	36
7.5～ (%)	97 (92.4)	8 (7.6)	105 (100.0)		22	127
8.0～ (%)	212 (88.3)	28 (11.7)	240 (100.0)	1	45	286
8.4～ (%)	67 (88.2)	9 (11.8)	76 (100.0)	1	9	86
8.5～ (%)	720 (91.7)	65 (8.3)	785 (100.0)	6	115	906
9.0～ (%)	1,286 (92.0)	112 (8.0)	1,398 (100.0)	11	193	1,602
9.5～ (%)	1,289 (91.6)	118 (8.4)	1,407 (100.0)	18	204	1,629
10.0～ (%)	150 (89.3)	18 (10.7)	168 (100.0)		23	191
10.1～ (%)	427 (92.2)	36 (7.8)	463 (100.0)	7	87	557
10.5～ (%)	227 (91.9)	20 (8.1)	247 (100.0)	2	47	296
11.0～ (%)	90 (92.8)	7 (7.2)	97 (100.0)	1	13	111
11.5～ (%)	24 (92.3)	2 (7.7)	26 (100.0)		3	29
12.0～ (%)	23 (95.8)	1 (4.2)	24 (100.0)		3	27
合計 (%)	4,664 (91.6)	426 (8.4)	5,090 (100.0)	47	775	5,912
記載なし (%)	696 (88.4)	91 (11.6)	787 (100.0)	19	2,223	3,029
総計 (%)	5,360 (91.2)	517 (8.8)	5,877 (100.0)	66	2,998	8,941
平均	9.41	9.38	9.40	9.55	9.41	9.41
標準偏差	0.79	0.74	0.79	0.60	0.84	0.80

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査