

表 830 心筋梗塞の既往 PTH値(pg/mL)別（腹膜透析患者）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	86 (89.6)	10 (10.4)	96 (100.0)		27	123
20～ (%)	210 (90.1)	23 (9.9)	233 (100.0)		48	281
40～ (%)	195 (88.6)	25 (11.4)	220 (100.0)	2	46	268
60～ (%)	245 (89.4)	29 (10.6)	274 (100.0)	1	40	315
80～ (%)	242 (91.3)	23 (8.7)	265 (100.0)	2	42	309
100～ (%)	242 (91.7)	22 (8.3)	264 (100.0)	1	51	316
120～ (%)	233 (91.0)	23 (9.0)	256 (100.0)	5	44	305
140～ (%)	221 (90.9)	22 (9.1)	243 (100.0)	7	35	285
160～ (%)	225 (91.5)	21 (8.5)	246 (100.0)		30	276
180～ (%)	513 (92.3)	43 (7.7)	556 (100.0)	1	97	654
240～ (%)	9 (90.0)	1 (10.0)	10 (100.0)			10
241～ (%)	342 (92.4)	28 (7.6)	370 (100.0)	3	58	431
300～ (%)	266 (92.7)	21 (7.3)	287 (100.0)	3	41	331
360～ (%)	143 (87.7)	20 (12.3)	163 (100.0)	1	36	200
420～ (%)	109 (92.4)	9 (7.6)	118 (100.0)	1	20	139
480～ (%)	35 (100.0)		35 (100.0)	1	7	43
500～ (%)	41 (91.1)	4 (8.9)	45 (100.0)		9	54
540～ (%)	57 (95.0)	3 (5.0)	60 (100.0)		13	73
600～ (%)	91 (96.8)	3 (3.2)	94 (100.0)		11	105
800～ (%)	87 (92.6)	7 (7.4)	94 (100.0)	1	15	110
合計 (%)	3,592 (91.4)	337 (8.6)	3,929 (100.0)	29	670	4,628
記載なし (%)	289 (94.1)	18 (5.9)	307 (100.0)	3	66	376
総計 (%)	3,881 (91.6)	355 (8.4)	4,236 (100.0)	32	736	5,004
平均	226.61	202.17	224.51	216.72	220.47	223.88
標準偏差	224.01	208.28	222.78	163.27	266.71	229.31

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査