

表 832 心筋梗塞の既往 ヘモグロビン濃度(g/dL)別（腹膜透析患者）

ヘモグロビン 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
5未満	4	2	6		1	7
(%)	(66.7)	(33.3)	(100.0)			
5～	9	1	10		4	14
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
6～	21	2	23		5	28
(%)	(91.3)	(8.7)	(100.0)			
7～	91	9	100		24	124
(%)	(91.0)	(9.0)	(100.0)			
8～	257	27	284	5	55	344
(%)	(90.5)	(9.5)	(100.0)			
9～	721	65	786	10	107	903
(%)	(91.7)	(8.3)	(100.0)			
10～	1,346	116	1,462	15	229	1,706
(%)	(92.1)	(7.9)	(100.0)			
11～	1,371	119	1,490	10	209	1,709
(%)	(92.0)	(8.0)	(100.0)			
12～	617	66	683	7	106	796
(%)	(90.3)	(9.7)	(100.0)			
13～	182	17	199	1	37	237
(%)	(91.5)	(8.5)	(100.0)			
14～	62	10	72		7	79
(%)	(86.1)	(13.9)	(100.0)			
合計	4,681	434	5,115	48	784	5,947
(%)	(91.5)	(8.5)	(100.0)			
記載なし	679	83	762	18	2,214	2,994
(%)	(89.1)	(10.9)	(100.0)			
総計	5,360	517	5,877	66	2,998	8,941
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
平均	10.82	10.84	10.82	10.56	10.75	10.81
標準偏差	1.39	1.60	1.41	1.24	1.48	1.42

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査