

表 833 心筋梗塞の既往 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

総コレステロール濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	34 (81.0)	8 (19.0)	42 (100.0)		8	50
100～ (%)	105 (81.4)	24 (18.6)	129 (100.0)		31	160
120～ (%)	332 (84.9)	59 (15.1)	391 (100.0)	3	54	448
140～ (%)	609 (88.5)	79 (11.5)	688 (100.0)	12	106	806
160～ (%)	685 (92.4)	56 (7.6)	741 (100.0)	6	118	865
180～ (%)	689 (94.8)	38 (5.2)	727 (100.0)	7	99	833
200～ (%)	457 (94.6)	26 (5.4)	483 (100.0)	6	75	564
220～ (%)	268 (94.7)	15 (5.3)	283 (100.0)	3	32	318
240～ (%)	124 (91.9)	11 (8.1)	135 (100.0)		24	159
260～ (%)	117 (94.4)	7 (5.6)	124 (100.0)	1	24	149
合計 (%)	3,420 (91.4)	323 (8.6)	3,743 (100.0)	38	571	4,352
記載なし (%)	1,940 (90.9)	194 (9.1)	2,134 (100.0)	28	2,427	4,589
総計 (%)	5,360 (91.2)	517 (8.8)	5,877 (100.0)	66	2,998	8,941
平均	180.52	165.37	179.21	177.79	177.79	179.01
標準偏差	39.98	42.37	40.41	36.01	41.70	40.54

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査