

表 835 心筋梗塞の既往 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

Non-HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
50未満 (%)	13 (76.5)	4 (23.5)	17 (100.0)		1	18
50～ (%)	83 (84.7)	15 (15.3)	98 (100.0)		16	114
70～ (%)	254 (87.9)	35 (12.1)	289 (100.0)	3	59	351
90～ (%)	512 (88.9)	64 (11.1)	576 (100.0)	8	76	660
110～ (%)	629 (92.0)	55 (8.0)	684 (100.0)	4	109	797
130～ (%)	524 (93.2)	38 (6.8)	562 (100.0)	4	96	662
150～ (%)	346 (92.8)	27 (7.2)	373 (100.0)	5	58	436
170～ (%)	211 (91.3)	20 (8.7)	231 (100.0)	1	31	263
190～ (%)	98 (93.3)	7 (6.7)	105 (100.0)	2	13	120
210～ (%)	68 (90.7)	7 (9.3)	75 (100.0)	1	14	90
合計 (%)	2,738 (91.0)	272 (9.0)	3,010 (100.0)	28	473	3,511
記載なし (%)	2,622 (91.5)	245 (8.5)	2,867 (100.0)	38	2,525	5,430
総計 (%)	5,360 (91.2)	517 (8.8)	5,877 (100.0)	66	2,998	8,941
平均	129.15	122.55	128.56	132.82	127.66	128.47
標準偏差	37.31	43.22	37.92	44.24	38.29	38.01

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査