

表 836 心筋梗塞の既往 収縮期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

収縮期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)					1	1
60～ (%)	10 (83.3)	2 (16.7)	12 (100.0)		1	13
80～ (%)	92 (85.2)	16 (14.8)	108 (100.0)		16	124
100～ (%)	513 (90.8)	52 (9.2)	565 (100.0)	4	72	641
120～ (%)	1,244 (91.5)	116 (8.5)	1,360 (100.0)	15	141	1,516
140～ (%)	1,306 (92.0)	114 (8.0)	1,420 (100.0)	12	147	1,579
160～ (%)	586 (93.8)	39 (6.2)	625 (100.0)	12	84	721
180～ (%)	166 (88.3)	22 (11.7)	188 (100.0)	2	27	217
200～ (%)	27 (100.0)		27 (100.0)		4	31
220～ (%)	5 (71.4)	2 (28.6)	7 (100.0)	1	2	10
合計 (%)	3,949 (91.6)	363 (8.4)	4,312 (100.0)	46	495	4,853
記載なし (%)	1,411 (90.2)	154 (9.8)	1,565 (100.0)	20	2,503	4,088
総計 (%)	5,360 (91.2)	517 (8.8)	5,877 (100.0)	66	2,998	8,941
平均	140.92	139.26	140.78	146.70	142.50	141.01
標準偏差	22.43	24.79	22.64	23.44	24.77	22.88

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査