

表 838 心筋梗塞の既往 脈拍(拍/分)別 (腹膜透析患者)

脈拍	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
40未満	2	1	3		2	5
(%)	(66.7)	(33.3)	(100.0)			
40～	18	4	22		3	25
(%)	(81.8)	(18.2)	(100.0)			
50～	139	26	165	1	21	187
(%)	(84.2)	(15.8)	(100.0)			
60～	671	81	752	7	91	850
(%)	(89.2)	(10.8)	(100.0)			
70～	1,011	96	1,107	6	158	1,271
(%)	(91.3)	(8.7)	(100.0)			
80～	835	74	909	5	110	1,024
(%)	(91.9)	(8.1)	(100.0)			
90～	390	36	426	5	50	481
(%)	(91.5)	(8.5)	(100.0)			
100～	170	5	175	4	25	204
(%)	(97.1)	(2.9)	(100.0)			
110～	43	2	45		7	52
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
120～	18	1	19		1	20
(%)	(94.7)	(5.3)	(100.0)			
合計	3,297	326	3,623	28	468	4,119
(%)	(91.0)	(9.0)	(100.0)			
記載なし	2,063	191	2,254	38	2,530	4,822
(%)	(91.5)	(8.5)	(100.0)			
総計	5,360	517	5,877	66	2,998	8,941
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
平均	78.40	74.92	78.09	80.75	77.94	78.09
標準偏差	13.20	13.14	13.23	15.38	13.42	13.27

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査