

表 840 脳出血の既往 治療方法(新分類)別(透析患者全体)

治療方法 (新分類)	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析 (%)	181,481 (93.5)	12,557 (6.5)	194,038 (100.0)	776	60,827	255,641
Off-line HDF (%)	4,477 (92.6)	359 (7.4)	4,836 (100.0)	12	1,467	6,315
On-line HDF (%)	26,140 (94.4)	1,541 (5.6)	27,681 (100.0)	82	8,327	36,090
Push/Pull HDF (%)	304 (92.1)	26 (7.9)	330 (100.0)	1	206	537
バイオフィルトレーション (%)	280 (95.2)	14 (4.8)	294 (100.0)		47	341
血液濾過 (%)	11 (64.7)	6 (35.3)	17 (100.0)		75	92
血液吸着透析 (リクセル) (%)	1,239 (95.4)	60 (4.6)	1,299 (100.0)	2	322	1,623
血液吸着透析 (その他) (%)	5 (100.0)		5 (100.0)		2	7
在宅血液透析 (%)	352 (98.3)	6 (1.7)	358 (100.0)	4	159	521
腹膜透析 (CAPD) (%)	3,014 (95.7)	137 (4.3)	3,151 (100.0)	17	1,853	5,021
腹膜透析 (APD) (%)	1,858 (95.8)	82 (4.2)	1,940 (100.0)	10	889	2,839
腹膜透析 (CCPD) (%)	761 (97.1)	23 (2.9)	784 (100.0)	8	289	1,081
合計 (%)	219,922 (93.7)	14,811 (6.3)	234,733 (100.0)	912	74,463	310,108
記載なし (%)						
総計 (%)	219,922 (93.7)	14,811 (6.3)	234,733 (100.0)	912	74,463	310,108

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査