

表 850 脳出血の既往 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往別（腹膜透析の経験があるか現在施行している患者）

被囊性腹膜硬化症 (EPS)の既往	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
なし	11,538 (%)	538 (4.5)	12,076 (100.0)	13	100	12,189
あり(剥離手術既往あり、 ステロイド使用歴あり)	420 (%)	46 (9.9)	466 (100.0)		59	525
あり(剥離手術既往あり、 ステロイド使用歴なし)	15 (%)		15 (100.0)		1	16
あり(剥離手術既往なし、 ステロイド使用歴あり)	60 (%)	5 (7.7)	65 (100.0)		3	68
あり(剥離手術既往なし、 ステロイド使用歴なし)	60 (%)	5 (7.7)	65 (100.0)		2	67
合計	12,093 (%)	594 (4.7)	12,687 (100.0)	13	165	12,865
不明	239 (%)	13 (5.2)	252 (100.0)	38	14	304
記載なし	110 (%)	70 (38.9)	180 (100.0)		3,781	3,961
総計	12,442 (%)	677 (5.2)	13,119 (100.0)	51	3,960	17,130

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査