

表 851 脳出血の既往 降圧薬使用の有無別（透析患者全体）

| 降圧薬使用の有無    | 既往なし              | 既往あり            | 合計                 | 不明  | 記載なし   | 総計      |
|-------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----|--------|---------|
| なし<br>(%)   | 71,288<br>(94.3)  | 4,345<br>(5.7)  | 75,633<br>(100.0)  | 170 | 4,085  | 79,888  |
| あり<br>(%)   | 143,590<br>(94.1) | 8,976<br>(5.9)  | 152,566<br>(100.0) | 366 | 13,703 | 166,635 |
| 合計<br>(%)   | 214,878<br>(94.2) | 13,321<br>(5.8) | 228,199<br>(100.0) | 536 | 17,788 | 246,523 |
| 不明<br>(%)   | 831<br>(94.9)     | 45<br>(5.1)     | 876<br>(100.0)     | 258 | 8      | 1,142   |
| 記載なし<br>(%) | 4,213<br>(74.5)   | 1,445<br>(25.5) | 5,658<br>(100.0)   | 118 | 56,667 | 62,443  |
| 総計<br>(%)   | 219,922<br>(93.7) | 14,811<br>(6.3) | 234,733<br>(100.0) | 912 | 74,463 | 310,108 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査