

表 859 脳出血の既往 透析前アルブミン濃度(g/dL)別 (透析患者全体)

透析前アルブミン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	137 (86.7)	21 (13.3)	158 (100.0)	2	25	185
1.5～ (%)	741 (90.7)	76 (9.3)	817 (100.0)	11	161	989
2.0～ (%)	3,033 (89.7)	348 (10.3)	3,381 (100.0)	29	651	4,061
2.5～ (%)	11,561 (90.5)	1,207 (9.5)	12,768 (100.0)	78	2,590	15,436
3.0～ (%)	50,499 (92.7)	4,005 (7.3)	54,504 (100.0)	210	11,394	66,108
3.5～ (%)	105,198 (94.3)	6,336 (5.7)	111,534 (100.0)	310	23,391	135,235
4.0～ (%)	39,326 (95.1)	2,019 (4.9)	41,345 (100.0)	105	9,058	50,508
4.5～ (%)	2,310 (95.5)	109 (4.5)	2,419 (100.0)	8	487	2,914
5.0～ (%)	170 (93.4)	12 (6.6)	182 (100.0)		21	203
合計 (%)	212,975 (93.8)	14,133 (6.2)	227,108 (100.0)	753	47,778	275,639
記載なし (%)	6,947 (91.1)	678 (8.9)	7,625 (100.0)	159	26,685	34,469
総計 (%)	219,922 (93.7)	14,811 (6.3)	234,733 (100.0)	912	74,463	310,108
平均	3.60	3.50	3.60	3.45	3.60	3.60
標準偏差	0.44	0.48	0.44	0.55	0.44	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査