

表 862 脳出血の既往 透析前リン濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

透析前リン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
3未満 (%)	8,022 (90.0)	894 (10.0)	8,916 (100.0)	38	1,932	10,886
3.0～ (%)	10,232 (92.0)	885 (8.0)	11,117 (100.0)	42	2,423	13,582
3.5～ (%)	18,256 (93.4)	1,290 (6.6)	19,546 (100.0)	71	4,065	23,682
4.0～ (%)	27,234 (93.5)	1,904 (6.5)	29,138 (100.0)	94	6,050	35,282
4.5～ (%)	32,506 (93.7)	2,190 (6.3)	34,696 (100.0)	103	7,260	42,059
5.0～ (%)	33,018 (94.0)	2,116 (6.0)	35,134 (100.0)	104	7,480	42,718
5.5～ (%)	28,516 (94.3)	1,727 (5.7)	30,243 (100.0)	89	6,373	36,705
6.0～ (%)	4,858 (94.3)	296 (5.7)	5,154 (100.0)	12	1,095	6,261
6.1～ (%)	16,403 (95.0)	857 (5.0)	17,260 (100.0)	56	3,793	21,109
6.5～ (%)	14,183 (94.4)	840 (5.6)	15,023 (100.0)	53	3,202	18,278
7.0～ (%)	8,767 (94.7)	490 (5.3)	9,257 (100.0)	30	1,990	11,277
7.5～ (%)	5,346 (94.7)	297 (5.3)	5,643 (100.0)	20	1,195	6,858
8.0～ (%)	3,142 (94.3)	191 (5.7)	3,333 (100.0)	8	712	4,053
8.5～ (%)	2,008 (95.2)	102 (4.8)	2,110 (100.0)	6	456	2,572
9.0～ (%)	3,102 (93.8)	204 (6.2)	3,306 (100.0)	18	753	4,077
合計 (%)	215,593 (93.8)	14,283 (6.2)	229,876 (100.0)	744	48,779	279,399
記載なし (%)	4,329 (89.1)	528 (10.9)	4,857 (100.0)	168	25,684	30,709
総計 (%)	219,922 (93.7)	14,811 (6.3)	234,733 (100.0)	912	74,463	310,108
平均	5.22	5.03	5.21	5.17	5.22	5.21
標準偏差	1.42	1.48	1.42	1.58	1.44	1.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査