

表 867 脳出血の既往 HDL-C濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	583	76	659	3	134	796
(%)	(88.5)	(11.5)	(100.0)			
20～	12,148	806	12,954	39	2,630	15,623
(%)	(93.8)	(6.2)	(100.0)			
30～	35,522	2,418	37,940	156	7,751	45,847
(%)	(93.6)	(6.4)	(100.0)			
40～	39,813	2,652	42,465	135	8,752	51,352
(%)	(93.8)	(6.2)	(100.0)			
50～	28,987	1,930	30,917	104	6,540	37,561
(%)	(93.8)	(6.2)	(100.0)			
60～	17,339	991	18,330	57	3,849	22,236
(%)	(94.6)	(5.4)	(100.0)			
70～	8,497	515	9,012	27	1,953	10,992
(%)	(94.3)	(5.7)	(100.0)			
80～	4,048	223	4,271	13	945	5,229
(%)	(94.8)	(5.2)	(100.0)			
90～	1,765	96	1,861	5	465	2,331
(%)	(94.8)	(5.2)	(100.0)			
100～	1,463	101	1,564	3	434	2,001
(%)	(93.5)	(6.5)	(100.0)			
合計	150,165	9,808	159,973	542	33,453	193,968
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
記載なし	69,757	5,003	74,760	370	41,010	116,140
(%)	(93.3)	(6.7)	(100.0)			
総計	219,922	14,811	234,733	912	74,463	310,108
(%)	(93.7)	(6.3)	(100.0)			
平均	48.69	47.87	48.64	47.28	49.30	48.75
標準偏差	16.58	16.68	16.59	15.41	17.27	16.71

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査