

表 868 脳出血の既往 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

Non-HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
50未満 (%)	2,554 (92.6)	204 (7.4)	2,758 (100.0)	22	630	3,410
50～ (%)	12,115 (93.5)	837 (6.5)	12,952 (100.0)	69	3,080	16,101
70～ (%)	27,057 (93.5)	1,876 (6.5)	28,933 (100.0)	112	6,524	35,569
90～ (%)	32,521 (94.0)	2,093 (6.0)	34,614 (100.0)	121	7,643	42,378
110～ (%)	26,397 (94.0)	1,696 (6.0)	28,093 (100.0)	82	6,028	34,203
130～ (%)	16,174 (94.0)	1,029 (6.0)	17,203 (100.0)	49	3,711	20,963
150～ (%)	8,102 (93.8)	533 (6.2)	8,635 (100.0)	32	1,923	10,590
170～ (%)	3,664 (93.9)	240 (6.1)	3,904 (100.0)	11	807	4,722
190～ (%)	1,400 (93.7)	94 (6.3)	1,494 (100.0)	5	310	1,809
210～ (%)	824 (92.8)	64 (7.2)	888 (100.0)	6	230	1,124
合計 (%)	130,808 (93.8)	8,666 (6.2)	139,474 (100.0)	509	30,886	170,869
記載なし (%)	89,114 (93.5)	6,145 (6.5)	95,259 (100.0)	403	43,577	139,239
総計 (%)	219,922 (93.7)	14,811 (6.3)	234,733 (100.0)	912	74,463	310,108
平均	107.26	106.60	107.22	102.01	106.53	107.08
標準偏差	33.49	34.42	33.55	36.82	33.80	33.61

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査