

表 870 脳出血の既往 透析前拡張期血圧(mmHg)別（透析患者全体）

透析前拡張 期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	59	5	64		16	80
(%)	(92.2)	(7.8)	(100.0)			
20～	595	38	633	3	160	796
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
40～	15,894	1,022	16,916	62	3,502	20,480
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
60～	86,948	5,667	92,615	359	18,904	111,878
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
80～	46,387	3,103	49,490	138	10,059	59,687
(%)	(93.7)	(6.3)	(100.0)			
90～	25,056	1,687	26,743	75	5,433	32,251
(%)	(93.7)	(6.3)	(100.0)			
100～	12,284	865	13,149	39	2,583	15,771
(%)	(93.4)	(6.6)	(100.0)			
120～	752	49	801	2	161	964
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
140～	58	5	63	1	11	75
(%)	(92.1)	(7.9)	(100.0)			
合計	188,033	12,441	200,474	679	40,829	241,982
(%)	(93.8)	(6.2)	(100.0)			
記載なし	31,889	2,370	34,259	233	33,634	68,126
(%)	(93.1)	(6.9)	(100.0)			
総計	219,922	14,811	234,733	912	74,463	310,108
(%)	(93.7)	(6.3)	(100.0)			
平均	77.77	78.09	77.79	76.14	77.72	77.77
標準偏差	14.44	14.53	14.44	15.02	14.45	14.45

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査