

表 889 脳出血の既往 体重減少率(%)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満 (%)	2,735 (90.4)	292 (9.6)	3,027 (100.0)	23	646	3,696
1.0～ (%)	4,869 (90.0)	539 (10.0)	5,408 (100.0)	19	1,182	6,609
2.0～ (%)	12,644 (91.0)	1,253 (9.0)	13,897 (100.0)	51	2,973	16,921
3.0～ (%)	26,542 (92.5)	2,149 (7.5)	28,691 (100.0)	103	5,790	34,584
4.0～ (%)	35,900 (93.4)	2,522 (6.6)	38,422 (100.0)	105	7,888	46,415
5.0～ (%)	28,195 (93.6)	1,934 (6.4)	30,129 (100.0)	96	6,064	36,289
6.0～ (%)	14,359 (93.9)	930 (6.1)	15,289 (100.0)	38	3,100	18,427
7.0～ (%)	5,498 (93.9)	355 (6.1)	5,853 (100.0)	15	1,240	7,108
8.0～ (%)	1,703 (93.5)	118 (6.5)	1,821 (100.0)	5	369	2,195
9.0～ (%)	912 (92.6)	73 (7.4)	985 (100.0)		220	1,205
合計 (%)	133,357 (92.9)	10,165 (7.1)	143,522 (100.0)	455	29,472	173,449
記載なし (%)	1,788 (91.1)	174 (8.9)	1,962 (100.0)	51	2,747	4,760
総計 (%)	135,145 (92.9)	10,339 (7.1)	145,484 (100.0)	506	32,219	178,209
平均	4.55	4.32	4.54	4.23	4.52	4.53
標準偏差	1.64	1.72	1.65	1.69	1.67	1.65

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査