

表 895 脳出血の既往 nPCR(g/kg/day)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満	278	36	314	4	51	369
(%)	(88.5)	(11.5)	(100.0)			
0.4～	6,237	719	6,956	36	1,426	8,418
(%)	(89.7)	(10.3)	(100.0)			
0.6～	39,217	3,288	42,505	151	8,300	50,956
(%)	(92.3)	(7.7)	(100.0)			
0.8～	54,794	3,850	58,644	163	11,704	70,511
(%)	(93.4)	(6.6)	(100.0)			
1.0～	22,104	1,424	23,528	65	4,655	28,248
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
1.2～	3,839	240	4,079	18	819	4,916
(%)	(94.1)	(5.9)	(100.0)			
1.4～	433	28	461	1	93	555
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
1.6～	60	6	66		13	79
(%)	(90.9)	(9.1)	(100.0)			
1.8～	21	2	23		2	25
(%)	(91.3)	(8.7)	(100.0)			
2.0～	32	2	34		4	38
(%)	(94.1)	(5.9)	(100.0)			
合計	127,015	9,595	136,610	438	27,067	164,115
(%)	(93.0)	(7.0)	(100.0)			
記載なし	8,130	744	8,874	68	5,152	14,094
(%)	(91.6)	(8.4)	(100.0)			
総計	135,145	10,339	145,484	506	32,219	178,209
(%)	(92.9)	(7.1)	(100.0)			
平均	0.86	0.84	0.86	0.84	0.86	0.86
標準偏差	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.18

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査