

表 896 脳出血の既往 %クレアチニン産生速度(%)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

%クレアチニン 産生速度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	9,146 (87.8)	1,272 (12.2)	10,418 (100.0)	48	2,084	12,550
60～ (%)	6,904 (91.2)	670 (8.8)	7,574 (100.0)	43	1,508	9,125
70～ (%)	10,800 (92.1)	928 (7.9)	11,728 (100.0)	35	2,191	13,954
80～ (%)	15,154 (92.2)	1,276 (7.8)	16,430 (100.0)	45	3,208	19,683
90～ (%)	19,306 (92.9)	1,473 (7.1)	20,779 (100.0)	58	4,021	24,858
100～ (%)	20,741 (93.6)	1,411 (6.4)	22,152 (100.0)	80	4,363	26,595
110～ (%)	18,704 (94.2)	1,158 (5.8)	19,862 (100.0)	57	3,935	23,854
120～ (%)	13,596 (94.7)	766 (5.3)	14,362 (100.0)	41	2,935	17,338
130～ (%)	7,527 (95.3)	373 (4.7)	7,900 (100.0)	23	1,685	9,608
140～ (%)	5,060 (95.0)	264 (5.0)	5,324 (100.0)	8	1,117	6,449
合計 (%)	126,938 (93.0)	9,591 (7.0)	136,529 (100.0)	438	27,047	164,014
記載なし (%)	8,207 (91.6)	748 (8.4)	8,955 (100.0)	68	5,172	14,195
総計 (%)	135,145 (92.9)	10,339 (7.1)	145,484 (100.0)	506	32,219	178,209
平均	99.17	92.03	98.67	94.21	99.16	98.74
標準偏差	25.68	27.90	25.91	27.10	26.19	25.96

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査