

表 897 脳出血の既往 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前アルブミン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	108 (84.4)	20 (15.6)	128 (100.0)	2	16	146
1.5～ (%)	580 (91.2)	56 (8.8)	636 (100.0)	10	125	771
2.0～ (%)	2,380 (89.2)	288 (10.8)	2,668 (100.0)	27	484	3,179
2.5～ (%)	9,191 (90.3)	985 (9.7)	10,176 (100.0)	64	1,910	12,150
3.0～ (%)	40,083 (92.3)	3,351 (7.7)	43,434 (100.0)	170	8,478	52,082
3.5～ (%)	83,989 (94.2)	5,142 (5.8)	89,131 (100.0)	248	17,756	107,135
4.0～ (%)	31,758 (95.1)	1,641 (4.9)	33,399 (100.0)	79	7,028	40,506
4.5～ (%)	1,874 (95.2)	95 (4.8)	1,969 (100.0)	6	387	2,362
5.0～ (%)	145 (92.9)	11 (7.1)	156 (100.0)		16	172
合計 (%)	170,108 (93.6)	11,589 (6.4)	181,697 (100.0)	606	36,200	218,503
記載なし (%)	4,978 (93.2)	365 (6.8)	5,343 (100.0)	118	5,007	10,468
総計 (%)	175,086 (93.6)	11,954 (6.4)	187,040 (100.0)	724	41,207	228,971
平均	3.60	3.50	3.60	3.43	3.61	3.60
標準偏差	0.44	0.48	0.44	0.56	0.44	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査