

表 898 脳出血の既往 透析前CRP濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前CRP濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	82,842 (94.2)	5,113 (5.8)	87,955 (100.0)	300	17,274	105,529
0.2～ (%)	27,706 (93.3)	1,986 (6.7)	29,692 (100.0)	104	5,582	35,378
0.5～ (%)	13,967 (92.6)	1,118 (7.4)	15,085 (100.0)	53	3,009	18,147
1.0～ (%)	9,080 (92.0)	787 (8.0)	9,867 (100.0)	40	1,865	11,772
2.0～ (%)	5,536 (91.2)	532 (8.8)	6,068 (100.0)	28	1,158	7,254
4.0～ (%)	1,962 (91.5)	182 (8.5)	2,144 (100.0)	20	418	2,582
6.0～ (%)	983 (92.1)	84 (7.9)	1,067 (100.0)	11	204	1,282
8.0～ (%)	524 (90.0)	58 (10.0)	582 (100.0)	2	110	694
10.0～ (%)	659 (90.4)	70 (9.6)	729 (100.0)	6	107	842
15.0～ (%)	431 (92.5)	35 (7.5)	466 (100.0)	6	88	560
合計 (%)	143,690 (93.5)	9,965 (6.5)	153,655 (100.0)	570	29,815	184,040
記載なし (%)	31,396 (94.0)	1,989 (6.0)	33,385 (100.0)	154	11,392	44,931
総計 (%)	175,086 (93.6)	11,954 (6.4)	187,040 (100.0)	724	41,207	228,971
平均	0.64	0.81	0.65	1.13	0.62	0.64
標準偏差	1.96	2.21	1.97	3.19	1.73	1.94

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査