

表 899 脳出血の既往 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前補正 カルシウム濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	684 (93.1)	51 (6.9)	735 (100.0)	3	136	874
7.0～ (%)	996 (95.7)	45 (4.3)	1,041 (100.0)	4	221	1,266
7.5～ (%)	3,839 (94.8)	210 (5.2)	4,049 (100.0)	14	908	4,971
8.0～ (%)	12,699 (94.4)	747 (5.6)	13,446 (100.0)	38	2,806	16,290
8.4～ (%)	3,715 (94.7)	207 (5.3)	3,922 (100.0)	10	744	4,676
8.5～ (%)	42,113 (94.4)	2,497 (5.6)	44,610 (100.0)	140	9,152	53,902
9.0～ (%)	51,128 (93.9)	3,350 (6.1)	54,478 (100.0)	204	10,554	65,236
9.5～ (%)	33,067 (93.3)	2,373 (6.7)	35,440 (100.0)	95	6,869	42,404
10.0～ (%)	4,068 (92.4)	335 (7.6)	4,403 (100.0)	16	808	5,227
10.1～ (%)	10,145 (91.9)	892 (8.1)	11,037 (100.0)	34	2,206	13,277
10.5～ (%)	4,860 (90.7)	501 (9.3)	5,361 (100.0)	21	1,071	6,453
11.0～ (%)	1,607 (88.8)	203 (11.2)	1,810 (100.0)	7	348	2,165
11.5～ (%)	557 (87.7)	78 (12.3)	635 (100.0)	4	130	769
12.0～ (%)	391 (85.7)	65 (14.3)	456 (100.0)	5	78	539
合計 (%)	169,869 (93.6)	11,554 (6.4)	181,423 (100.0)	595	36,031	218,049
記載なし (%)	5,217 (92.9)	400 (7.1)	5,617 (100.0)	129	5,176	10,922
総計 (%)	175,086 (93.6)	11,954 (6.4)	187,040 (100.0)	724	41,207	228,971
平均	9.18	9.30	9.19	9.21	9.17	9.18
標準偏差	0.73	0.81	0.74	0.80	0.74	0.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査