

表 904 脳出血の既往 総コレステロール濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

総コレステロール濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	4,955 (92.9)	378 (7.1)	5,333 (100.0)	30	1,091	6,454
100～ (%)	14,370 (93.5)	991 (6.5)	15,361 (100.0)	64	3,195	18,620
120～ (%)	26,520 (93.3)	1,893 (6.7)	28,413 (100.0)	109	5,793	34,315
140～ (%)	30,069 (93.8)	1,988 (6.2)	32,057 (100.0)	84	6,685	38,826
160～ (%)	24,539 (93.6)	1,678 (6.4)	26,217 (100.0)	70	5,296	31,583
180～ (%)	15,196 (93.8)	999 (6.2)	16,195 (100.0)	35	3,389	19,619
200～ (%)	7,875 (94.1)	493 (5.9)	8,368 (100.0)	22	1,819	10,209
220～ (%)	3,412 (93.1)	251 (6.9)	3,663 (100.0)	8	804	4,475
240～ (%)	1,332 (93.0)	100 (7.0)	1,432 (100.0)	5	296	1,733
260～ (%)	841 (93.2)	61 (6.8)	902 (100.0)	7	202	1,111
合計 (%)	129,109 (93.6)	8,832 (6.4)	137,941 (100.0)	434	28,570	166,945
記載なし (%)	45,977 (93.6)	3,122 (6.4)	49,099 (100.0)	290	12,637	62,026
総計 (%)	175,086 (93.6)	11,954 (6.4)	187,040 (100.0)	724	41,207	228,971
平均	154.69	154.04	154.65	148.89	155.10	154.71
標準偏差	35.13	36.13	35.19	38.83	35.66	35.28

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査