

表 905 脳出血の既往 HDL-C濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	497	66	563	3	105	671
(%)	(88.3)	(11.7)	(100.0)			
20～	10,091	694	10,785	32	2,029	12,846
(%)	(93.6)	(6.4)	(100.0)			
30～	28,809	2,043	30,852	122	5,914	36,888
(%)	(93.4)	(6.6)	(100.0)			
40～	31,932	2,123	34,055	105	6,569	40,729
(%)	(93.8)	(6.2)	(100.0)			
50～	22,636	1,543	24,179	84	4,817	29,080
(%)	(93.6)	(6.4)	(100.0)			
60～	13,171	777	13,948	40	2,804	16,792
(%)	(94.4)	(5.6)	(100.0)			
70～	6,368	411	6,779	20	1,402	8,201
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
80～	2,977	175	3,152	9	673	3,834
(%)	(94.4)	(5.6)	(100.0)			
90～	1,304	77	1,381	2	350	1,733
(%)	(94.4)	(5.6)	(100.0)			
100～	1,049	76	1,125	1	332	1,458
(%)	(93.2)	(6.8)	(100.0)			
合計	118,834	7,985	126,819	418	24,995	152,232
(%)	(93.7)	(6.3)	(100.0)			
記載なし	56,252	3,969	60,221	306	16,212	76,739
(%)	(93.4)	(6.6)	(100.0)			
総計	175,086	11,954	187,040	724	41,207	228,971
(%)	(93.6)	(6.4)	(100.0)			
平均	48.15	47.48	48.11	46.34	49.01	48.25
標準偏差	16.37	16.67	16.39	14.55	17.32	16.54

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査