

表 908 脳出血の既往 透析前拡張期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

| 透析前拡張<br>期血圧 | 既往なし              | 既往あり            | 合計                 | 不明    | 記載なし   | 総計      |
|--------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------|--------|---------|
| 20未満<br>(%)  | 50<br>(92.6)      | 4<br>(7.4)      | 54<br>(100.0)      |       | 13     | 67      |
| 20～<br>(%)   | 464<br>(93.0)     | 35<br>(7.0)     | 499<br>(100.0)     | 3     | 110    | 612     |
| 40～<br>(%)   | 12,729<br>(93.7)  | 858<br>(6.3)    | 13,587<br>(100.0)  | 49    | 2,721  | 16,357  |
| 60～<br>(%)   | 70,209<br>(93.7)  | 4,703<br>(6.3)  | 74,912<br>(100.0)  | 289   | 14,424 | 89,625  |
| 80～<br>(%)   | 36,743<br>(93.6)  | 2,493<br>(6.4)  | 39,236<br>(100.0)  | 104   | 7,500  | 46,840  |
| 90～<br>(%)   | 19,533<br>(93.4)  | 1,371<br>(6.6)  | 20,904<br>(100.0)  | 59    | 3,985  | 24,948  |
| 100～<br>(%)  | 9,500<br>(93.1)   | 703<br>(6.9)    | 10,203<br>(100.0)  | 32    | 1,907  | 12,142  |
| 120～<br>(%)  | 592<br>(94.3)     | 36<br>(5.7)     | 628<br>(100.0)     | 2     | 111    | 741     |
| 140～<br>(%)  | 47<br>(92.2)      | 4<br>(7.8)      | 51<br>(100.0)      |       | 6      | 57      |
| 合計<br>(%)    | 149,867<br>(93.6) | 10,207<br>(6.4) | 160,074<br>(100.0) | 538   | 30,777 | 191,389 |
| 記載なし<br>(%)  | 25,219<br>(93.5)  | 1,747<br>(6.5)  | 26,966<br>(100.0)  | 186   | 10,430 | 37,582  |
| 総計<br>(%)    | 175,086<br>(93.6) | 11,954<br>(6.4) | 187,040<br>(100.0) | 724   | 41,207 | 228,971 |
| 平均           | 77.56             | 77.87           | 77.58              | 75.80 | 77.45  | 77.56   |
| 標準偏差         | 14.37             | 14.52           | 14.38              | 14.62 | 14.41  | 14.39   |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査