

表 912 脳出血の既往 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	3,883 (96.3)	149 (3.7)	4,032 (100.0)	16	916	4,964
2年～ (%)	6,655 (95.0)	350 (5.0)	7,005 (100.0)	22	1,588	8,615
5年～ (%)	7,677 (93.9)	498 (6.1)	8,175 (100.0)	14	1,927	10,116
10年～ (%)	4,741 (93.1)	354 (6.9)	5,095 (100.0)	11	1,088	6,194
15年～ (%)	2,934 (92.7)	232 (7.3)	3,166 (100.0)	12	746	3,924
20年～ (%)	1,975 (92.9)	150 (7.1)	2,125 (100.0)	4	508	2,637
25年～ (%)	1,260 (93.7)	85 (6.3)	1,345 (100.0)	5	301	1,651
30年～ (%)	853 (95.7)	38 (4.3)	891 (100.0)	2	230	1,123
35年～ (%)	449 (94.9)	24 (5.1)	473 (100.0)	2	112	587
40年～ (%)	90 (93.8)	6 (6.3)	96 (100.0)		28	124
合計 (%)	30,517 (94.2)	1,886 (5.8)	32,403 (100.0)	88	7,444	39,935
不明 (%)	4 (100.0)		4 (100.0)	1	6	11
記載なし (%)						
総計 (%)	30,521 (94.2)	1,886 (5.8)	32,407 (100.0)	89	7,450	39,946
平均	9.94	10.85	10.00	9.84	10.14	10.02
標準偏差	8.86	8.40	8.84	9.63	9.00	8.87

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査