

表 925 脳出血の既往 透析後体重(kg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析後体重	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	8	1	9		3	12
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
20～	59	5	64	1	11	76
(%)	(92.2)	(7.8)	(100.0)			
30～	2,028	169	2,197	9	476	2,682
(%)	(92.3)	(7.7)	(100.0)			
40～	7,712	547	8,259	30	1,716	10,005
(%)	(93.4)	(6.6)	(100.0)			
50～	9,690	598	10,288	20	2,182	12,490
(%)	(94.2)	(5.8)	(100.0)			
60～	6,552	365	6,917	13	1,435	8,365
(%)	(94.7)	(5.3)	(100.0)			
70～	2,753	112	2,865	3	555	3,423
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
80～	1,025	46	1,071	2	200	1,273
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
90～	361	13	374		81	455
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
100～	108	6	114		28	142
(%)	(94.7)	(5.3)	(100.0)			
110～	48	4	52		9	61
(%)	(92.3)	(7.7)	(100.0)			
120～	31	1	32		5	37
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
合計	30,375	1,867	32,242	78	6,701	39,021
(%)	(94.2)	(5.8)	(100.0)			
記載なし	146	19	165	11	749	925
(%)	(88.5)	(11.5)	(100.0)			
総計	30,521	1,886	32,407	89	7,450	39,946
(%)	(94.2)	(5.8)	(100.0)			
平均	56.82	54.57	56.69	51.82	56.38	56.63
標準偏差	13.08	12.52	13.06	11.09	12.90	13.03

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査