

表 926 脳出血の既往 体重減少量(kg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満 (%)	83 (96.5)	3 (3.5)	86 (100.0)	1	10	97
0.0～ (%)	1,003 (91.3)	96 (8.7)	1,099 (100.0)	5	216	1,320
1.0～ (%)	5,680 (92.7)	447 (7.3)	6,127 (100.0)	17	1,256	7,400
2.0～ (%)	11,317 (93.9)	735 (6.1)	12,052 (100.0)	29	2,573	14,654
3.0～ (%)	6,283 (94.9)	339 (5.1)	6,622 (100.0)	7	1,385	8,014
4.0～ (%)	1,735 (95.5)	81 (4.5)	1,816 (100.0)	1	374	2,191
5.0～ (%)	311 (95.4)	15 (4.6)	326 (100.0)	1	73	400
6.0～ (%)	45 (95.7)	2 (4.3)	47 (100.0)		12	59
7.0～ (%)	14 (100.0)		14 (100.0)		2	16
8.0～ (%)	24 (88.9)	3 (11.1)	27 (100.0)		3	30
合計 (%)	26,495 (93.9)	1,721 (6.1)	28,216 (100.0)	61	5,904	34,181
記載なし (%)	139 (89.7)	16 (10.3)	155 (100.0)	11	624	790
総計 (%)	26,634 (93.9)	1,737 (6.1)	28,371 (100.0)	72	6,528	34,971
平均	2.58	2.41	2.57	2.18	2.57	2.57
標準偏差	1.03	1.04	1.03	0.92	1.03	1.03

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査