

表 929 脳出血の既往 透析前BUN(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前BUN	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	29	2	31		8	39
(%)	(93.5)	(6.5)	(100.0)			
20～	239	24	263	1	45	309
(%)	(90.9)	(9.1)	(100.0)			
30～	1,284	93	1,377	3	273	1,653
(%)	(93.2)	(6.8)	(100.0)			
40～	3,691	275	3,966	16	803	4,785
(%)	(93.1)	(6.9)	(100.0)			
50～	6,390	483	6,873	11	1,434	8,318
(%)	(93.0)	(7.0)	(100.0)			
60～	6,906	375	7,281	15	1,508	8,804
(%)	(94.8)	(5.2)	(100.0)			
70～	4,689	278	4,967	9	1,110	6,086
(%)	(94.4)	(5.6)	(100.0)			
80～	2,213	121	2,334	4	493	2,831
(%)	(94.8)	(5.2)	(100.0)			
90～	812	48	860	1	190	1,051
(%)	(94.4)	(5.6)	(100.0)			
100～	213	19	232	1	46	279
(%)	(91.8)	(8.2)	(100.0)			
110～	52	4	56		18	74
(%)	(92.9)	(7.1)	(100.0)			
120～	14	1	15		5	20
(%)	(93.3)	(6.7)	(100.0)			
合計	26,532	1,723	28,255	61	5,933	34,249
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
記載なし	102	14	116	11	595	722
(%)	(87.9)	(12.1)	(100.0)			
総計	26,634	1,737	28,371	72	6,528	34,971
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
平均	62.25	60.64	62.16	59.00	62.64	62.23
標準偏差	15.06	15.28	15.08	15.24	15.10	15.08

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査