

表 930 脳出血の既往 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

| 透析前クレアチニン<br>濃度 | 既往なし             | 既往あり           | 合計                | 不明   | 記載なし  | 総計     |
|-----------------|------------------|----------------|-------------------|------|-------|--------|
| 2未満<br>(%)      | 3<br>(100.0)     |                | 3<br>(100.0)      |      |       | 3      |
| 2～<br>(%)       | 110<br>(89.4)    | 13<br>(10.6)   | 123<br>(100.0)    |      | 24    | 147    |
| 4～<br>(%)       | 692<br>(91.3)    | 66<br>(8.7)    | 758<br>(100.0)    | 3    | 157   | 918    |
| 6～<br>(%)       | 2,834<br>(92.1)  | 242<br>(7.9)   | 3,076<br>(100.0)  | 10   | 664   | 3,750  |
| 8～<br>(%)       | 6,758<br>(93.1)  | 498<br>(6.9)   | 7,256<br>(100.0)  | 20   | 1,471 | 8,747  |
| 10～<br>(%)      | 7,923<br>(94.1)  | 493<br>(5.9)   | 8,416<br>(100.0)  | 18   | 1,713 | 10,147 |
| 12～<br>(%)      | 5,172<br>(94.8)  | 282<br>(5.2)   | 5,454<br>(100.0)  | 7    | 1,177 | 6,638  |
| 14～<br>(%)      | 2,207<br>(95.9)  | 95<br>(4.1)    | 2,302<br>(100.0)  | 3    | 515   | 2,820  |
| 16～<br>(%)      | 814<br>(96.2)    | 32<br>(3.8)    | 846<br>(100.0)    |      | 202   | 1,048  |
| 合計<br>(%)       | 26,513<br>(93.9) | 1,721<br>(6.1) | 28,234<br>(100.0) | 61   | 5,923 | 34,218 |
| 記載なし<br>(%)     | 121<br>(88.3)    | 16<br>(11.7)   | 137<br>(100.0)    | 11   | 605   | 753    |
| 総計<br>(%)       | 26,634<br>(93.9) | 1,737<br>(6.1) | 28,371<br>(100.0) | 72   | 6,528 | 34,971 |
| 平均              | 10.75            | 10.17          | 10.71             | 9.75 | 10.77 | 10.72  |
| 標準偏差            | 2.65             | 2.57           | 2.65              | 2.40 | 2.70  | 2.66   |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査