

表 932 脳出血の既往 equilibrated Kt/V (eKt/V) 別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	14 (93.3)	1 (6.7)	15 (100.0)		5	20
0.4～ (%)	30 (83.3)	6 (16.7)	36 (100.0)	1	7	44
0.6～ (%)	257 (93.5)	18 (6.5)	275 (100.0)		61	336
0.8～ (%)	1,703 (93.5)	119 (6.5)	1,822 (100.0)	2	387	2,211
1.0～ (%)	5,813 (94.1)	367 (5.9)	6,180 (100.0)	14	1,308	7,502
1.2～ (%)	7,928 (93.8)	521 (6.2)	8,449 (100.0)	19	1,671	10,139
1.4～ (%)	5,604 (94.0)	358 (6.0)	5,962 (100.0)	16	1,152	7,130
1.6～ (%)	2,658 (94.1)	168 (5.9)	2,826 (100.0)	6	540	3,372
1.8～ (%)	1,015 (94.1)	64 (5.9)	1,079 (100.0)	1	212	1,292
2.0～ (%)	695 (94.8)	38 (5.2)	733 (100.0)	2	155	890
合計 (%)	25,717 (93.9)	1,660 (6.1)	27,377 (100.0)	61	5,498	32,936
記載なし (%)	917 (92.3)	77 (7.7)	994 (100.0)	11	1,030	2,035
総計 (%)	26,634 (93.9)	1,737 (6.1)	28,371 (100.0)	72	6,528	34,971
平均	1.35	1.34	1.35	1.37	1.34	1.35
標準偏差	0.29	0.29	0.29	0.30	0.29	0.29

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査