

表 933 脳出血の既往 nPCR(g/kg/day)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満	34	3	37		6	43
(%)	(91.9)	(8.1)	(100.0)			
0.4～	870	72	942	2	186	1,130
(%)	(92.4)	(7.6)	(100.0)			
0.6～	7,029	524	7,553	26	1,494	9,073
(%)	(93.1)	(6.9)	(100.0)			
0.8～	11,695	693	12,388	22	2,470	14,880
(%)	(94.4)	(5.6)	(100.0)			
1.0～	5,088	313	5,401	8	1,122	6,531
(%)	(94.2)	(5.8)	(100.0)			
1.2～	910	51	961	3	203	1,167
(%)	(94.7)	(5.3)	(100.0)			
1.4～	105	7	112		16	128
(%)	(93.8)	(6.3)	(100.0)			
1.6～	10		10		3	13
(%)	(100.0)		(100.0)			
1.8～	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
2.0～	5		5		1	6
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	25,747	1,663	27,410	61	5,501	32,972
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
記載なし	887	74	961	11	1,027	1,999
(%)	(92.3)	(7.7)	(100.0)			
総計	26,634	1,737	28,371	72	6,528	34,971
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
平均	0.88	0.86	0.88	0.85	0.88	0.88
標準偏差	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査