

表 934 脳出血の既往 %クレアチニン産生速度(%)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

%クレアチニン 産生速度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	1,240 (90.7)	127 (9.3)	1,367 (100.0)	4	263	1,634
60～ (%)	1,092 (93.0)	82 (7.0)	1,174 (100.0)	4	226	1,404
70～ (%)	1,929 (92.8)	150 (7.2)	2,079 (100.0)	4	395	2,478
80～ (%)	3,023 (92.8)	233 (7.2)	3,256 (100.0)	7	605	3,868
90～ (%)	3,968 (93.8)	261 (6.2)	4,229 (100.0)	16	855	5,100
100～ (%)	4,554 (93.7)	307 (6.3)	4,861 (100.0)	9	964	5,834
110～ (%)	4,290 (94.9)	229 (5.1)	4,519 (100.0)	9	871	5,399
120～ (%)	3,027 (95.5)	143 (4.5)	3,170 (100.0)	3	670	3,843
130～ (%)	1,612 (95.5)	76 (4.5)	1,688 (100.0)	5	399	2,092
140～ (%)	1,002 (94.9)	54 (5.1)	1,056 (100.0)		252	1,308
合計 (%)	25,737 (93.9)	1,662 (6.1)	27,399 (100.0)	61	5,500	32,960
記載なし (%)	897 (92.3)	75 (7.7)	972 (100.0)	11	1,028	2,011
総計 (%)	26,634 (93.9)	1,737 (6.1)	28,371 (100.0)	72	6,528	34,971
平均	102.01	97.24	101.72	96.10	103.00	101.92
標準偏差	23.63	24.95	23.74	23.11	24.51	23.87

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査