

表 935 脳出血の既往 透析前アルブミン濃度(g/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前アルブミン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	10 (100.0)	6 (10.9)	10 (100.0)			10
1.5～ (%)	49 (89.1)	6 (10.9)	55 (100.0)	1	6	62
2.0～ (%)	223 (89.6)	26 (10.4)	249 (100.0)	1	44	294
2.5～ (%)	1,032 (90.0)	115 (10.0)	1,147 (100.0)	7	238	1,392
3.0～ (%)	6,831 (93.8)	455 (6.2)	7,286 (100.0)	15	1,506	8,807
3.5～ (%)	16,124 (94.4)	953 (5.6)	17,077 (100.0)	32	3,476	20,585
4.0～ (%)	5,629 (95.1)	290 (4.9)	5,919 (100.0)	14	1,225	7,158
4.5～ (%)	263 (97.4)	7 (2.6)	270 (100.0)		47	317
5.0～ (%)	16 (100.0)		16 (100.0)		2	18
合計 (%)	30,177 (94.2)	1,852 (5.8)	32,029 (100.0)	70	6,544	38,643
記載なし (%)	344 (91.0)	34 (9.0)	378 (100.0)	19	906	1,303
総計 (%)	30,521 (94.2)	1,886 (5.8)	32,407 (100.0)	89	7,450	39,946
平均	3.64	3.57	3.64	3.54	3.64	3.64
標準偏差	0.39	0.42	0.39	0.49	0.38	0.39

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査