

表 936 脳出血の既往 透析前CRP濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前CRP濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	16,403 (94.7)	918 (5.3)	17,321 (100.0)	40	3,343	20,704
0.2～ (%)	5,104 (94.3)	311 (5.7)	5,415 (100.0)	7	1,055	6,477
0.5～ (%)	2,439 (92.9)	185 (7.1)	2,624 (100.0)	6	543	3,173
1.0～ (%)	1,513 (92.4)	125 (7.6)	1,638 (100.0)	3	362	2,003
2.0～ (%)	874 (92.2)	74 (7.8)	948 (100.0)		186	1,134
4.0～ (%)	308 (94.2)	19 (5.8)	327 (100.0)	3	77	407
6.0～ (%)	134 (95.7)	6 (4.3)	140 (100.0)	1	30	171
8.0～ (%)	66 (94.3)	4 (5.7)	70 (100.0)		24	94
10.0～ (%)	85 (89.5)	10 (10.5)	95 (100.0)		13	108
15.0～ (%)	62 (92.5)	5 (7.5)	67 (100.0)	2	15	84
合計 (%)	26,988 (94.2)	1,657 (5.8)	28,645 (100.0)	62	5,648	34,355
記載なし (%)	3,533 (93.9)	229 (6.1)	3,762 (100.0)	27	1,802	5,591
総計 (%)	30,521 (94.2)	1,886 (5.8)	32,407 (100.0)	89	7,450	39,946
平均	0.54	0.68	0.55	1.20	0.57	0.55
標準偏差	1.74	2.18	1.77	3.73	1.66	1.76

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査