

表 942 脳出血の既往 総コレステロール濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

総コレステロール 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	763 (93.3)	55 (6.7)	818 (100.0)	8	166	992
100～ (%)	2,235 (93.1)	166 (6.9)	2,401 (100.0)	13	574	2,988
120～ (%)	4,397 (94.0)	281 (6.0)	4,678 (100.0)	10	1,006	5,694
140～ (%)	5,399 (94.6)	309 (5.4)	5,708 (100.0)	10	1,187	6,905
160～ (%)	4,647 (94.1)	293 (5.9)	4,940 (100.0)	16	1,055	6,011
180～ (%)	3,031 (94.7)	168 (5.3)	3,199 (100.0)	4	670	3,873
200～ (%)	1,758 (94.7)	98 (5.3)	1,856 (100.0)	5	392	2,253
220～ (%)	732 (94.6)	42 (5.4)	774 (100.0)		182	956
240～ (%)	300 (95.5)	14 (4.5)	314 (100.0)		70	384
260～ (%)	154 (93.3)	11 (6.7)	165 (100.0)		51	216
合計 (%)	23,416 (94.2)	1,437 (5.8)	24,853 (100.0)	66	5,353	30,272
記載なし (%)	7,105 (94.1)	449 (5.9)	7,554 (100.0)	23	2,097	9,674
総計 (%)	30,521 (94.2)	1,886 (5.8)	32,407 (100.0)	89	7,450	39,946
平均	158.17	155.68	158.02	142.38	158.11	158.00
標準偏差	35.46	36.30	35.51	36.85	36.50	35.70

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査