

表 943 脳出血の既往 HDL-C濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	59	7	66		15	81
(%)	(89.4)	(10.6)	(100.0)			
20～	1,458	77	1,535	3	336	1,874
(%)	(95.0)	(5.0)	(100.0)			
30～	4,782	281	5,063	18	1,050	6,131
(%)	(94.4)	(5.6)	(100.0)			
40～	5,669	390	6,059	12	1,289	7,360
(%)	(93.6)	(6.4)	(100.0)			
50～	4,617	293	4,910	9	1,052	5,971
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
60～	3,050	158	3,208	11	638	3,857
(%)	(95.1)	(4.9)	(100.0)			
70～	1,576	79	1,655	3	365	2,023
(%)	(95.2)	(4.8)	(100.0)			
80～	794	40	834	3	176	1,013
(%)	(95.2)	(4.8)	(100.0)			
90～	340	15	355	3	73	431
(%)	(95.8)	(4.2)	(100.0)			
100～	295	17	312		71	383
(%)	(94.6)	(5.4)	(100.0)			
合計	22,640	1,357	23,997	62	5,065	29,124
(%)	(94.3)	(5.7)	(100.0)			
記載なし	7,881	529	8,410	27	2,385	10,822
(%)	(93.7)	(6.3)	(100.0)			
総計	30,521	1,886	32,407	89	7,450	39,946
(%)	(94.2)	(5.8)	(100.0)			
平均	50.90	49.83	50.84	51.58	50.92	50.85
標準偏差	17.21	16.27	17.16	18.18	17.30	17.18

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査