

表 944 脳出血の既往 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

Non-HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
50未満 (%)	386 (93.2)	28 (6.8)	414 (100.0)	7	108	529
50～ (%)	1,822 (93.7)	122 (6.3)	1,944 (100.0)	12	447	2,403
70～ (%)	3,927 (93.5)	271 (6.5)	4,198 (100.0)	17	923	5,138
90～ (%)	4,870 (94.8)	265 (5.2)	5,135 (100.0)	8	1,122	6,265
110～ (%)	3,966 (94.3)	238 (5.7)	4,204 (100.0)	5	953	5,162
130～ (%)	2,415 (94.1)	151 (5.9)	2,566 (100.0)	8	575	3,149
150～ (%)	1,217 (94.0)	78 (6.0)	1,295 (100.0)	2	300	1,597
170～ (%)	532 (95.2)	27 (4.8)	559 (100.0)	1	122	682
190～ (%)	195 (94.7)	11 (5.3)	206 (100.0)		56	262
210～ (%)	103 (95.4)	5 (4.6)	108 (100.0)		33	141
合計 (%)	19,433 (94.2)	1,196 (5.8)	20,629 (100.0)	60	4,639	25,328
記載なし (%)	11,088 (94.1)	690 (5.9)	11,778 (100.0)	29	2,811	14,618
総計 (%)	30,521 (94.2)	1,886 (5.8)	32,407 (100.0)	89	7,450	39,946
平均	107.18	105.99	107.11	88.45	107.40	107.12
標準偏差	33.19	33.59	33.21	35.46	33.97	33.37

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査