

表 946 脳出血の既往 透析前拡張期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前拡張 期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	5 (100.0)		5 (100.0)		2	7
20～ (%)	90 (96.8)	3 (3.2)	93 (100.0)		28	121
40～ (%)	2,154 (95.4)	104 (4.6)	2,258 (100.0)	6	416	2,680
60～ (%)	11,622 (94.3)	703 (5.7)	12,325 (100.0)	36	2,611	14,972
80～ (%)	6,954 (93.8)	457 (6.2)	7,411 (100.0)	16	1,576	9,003
90～ (%)	4,163 (94.4)	247 (5.6)	4,410 (100.0)	7	900	5,317
100～ (%)	2,124 (94.1)	132 (5.9)	2,256 (100.0)	4	441	2,701
120～ (%)	128 (93.4)	9 (6.6)	137 (100.0)		32	169
140～ (%)	9 (90.0)	1 (10.0)	10 (100.0)	1	1	12
合計 (%)	27,249 (94.3)	1,656 (5.7)	28,905 (100.0)	70	6,007	34,982
記載なし (%)	3,272 (93.4)	230 (6.6)	3,502 (100.0)	19	1,443	4,964
総計 (%)	30,521 (94.2)	1,886 (5.8)	32,407 (100.0)	89	7,450	39,946
平均	79.12	79.82	79.16	78.30	79.22	79.17
標準偏差	14.74	14.40	14.73	18.70	14.54	14.70

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査