

表 947 脳出血の既往 透析前脈拍(拍/分)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前脈拍	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
40未満	14		14		3	17
(%)	(100.0)		(100.0)			
40～	240	16	256		39	295
(%)	(93.8)	(6.3)	(100.0)			
50～	2,050	129	2,179	8	445	2,632
(%)	(94.1)	(5.9)	(100.0)			
60～	6,543	475	7,018	20	1,452	8,490
(%)	(93.2)	(6.8)	(100.0)			
70～	8,226	477	8,703	16	1,826	10,545
(%)	(94.5)	(5.5)	(100.0)			
80～	5,471	307	5,778	16	1,269	7,063
(%)	(94.7)	(5.3)	(100.0)			
90～	2,546	150	2,696	10	587	3,293
(%)	(94.4)	(5.6)	(100.0)			
100～	817	44	861		181	1,042
(%)	(94.9)	(5.1)	(100.0)			
110～	214	11	225		36	261
(%)	(95.1)	(4.9)	(100.0)			
120～	90	4	94		12	106
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
合計	26,211	1,613	27,824	70	5,850	33,744
(%)	(94.2)	(5.8)	(100.0)			
記載なし	4,310	273	4,583	19	1,600	6,202
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
総計	30,521	1,886	32,407	89	7,450	39,946
(%)	(94.2)	(5.8)	(100.0)			
平均	75.46	74.50	75.40	74.77	75.55	75.43
標準偏差	13.01	12.83	13.00	12.18	12.61	12.93

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査