

表 949 脳出血の既往 年齢(歳)別(腹膜透析患者)

| 年齢 | 既往なし | 既往あり | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|--------------|-----------------|--------------|------------------|-------|-------|-------|
| 15歳未満 (%) | 55 (94.8) | 3 (5.2) | 58 (100.0) | | 39 | 97 |
| 15歳～ (%) | 83 (98.8) | 1 (1.2) | 84 (100.0) | 2 | 25 | 111 |
| 30歳～ (%) | 432 (97.5) | 11 (2.5) | 443 (100.0) | 2 | 256 | 701 |
| 45歳～ (%) | 1,466 (97.2) | 42 (2.8) | 1,508 (100.0) | 4 | 790 | 2,302 |
| 60歳～ (%) | 2,531 (95.1) | 130 (4.9) | 2,661 (100.0) | 18 | 1,355 | 4,034 |
| 75歳～ (%) | 997 (95.2) | 50 (4.8) | 1,047 (100.0) | 9 | 535 | 1,591 |
| 90歳～ (%) | 69 (93.2) | 5 (6.8) | 74 (100.0) | | 31 | 105 |
| 合計 (%) | 5,633 (95.9) | 242 (4.1) | 5,875 (100.0) | 35 | 3,031 | 8,941 |
| 不明 (%) | | | | | | |
| 記載なし (%) | | | | | | |
| 総計 (%) | 5,633 (95.9) | 242 (4.1) | 5,875 (100.0) | 35 | 3,031 | 8,941 |
| 平均 | 62.42 | 65.42 | 62.55 | 63.91 | 62.24 | 62.45 |
| 標準偏差 | 14.52 | 13.37 | 14.49 | 15.55 | 14.61 | 14.53 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査