

表 951 脳出血の既往 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	1,980	76	2,056	5	998	3,059
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	69	2	71		22	93
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	45	4	49		25	74
(%)	(91.8)	(8.2)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	29	1	30		2	32
(%)	(96.7)	(3.3)	(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	51	5	56	1	28	85
(%)	(91.1)	(8.9)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	149	9	158	2	83	243
(%)	(94.3)	(5.7)	(100.0)			
腎硬化症	701	31	732	7	344	1,083
(%)	(95.8)	(4.2)	(100.0)			
悪性高血圧	68	5	73	1	33	107
(%)	(93.2)	(6.8)	(100.0)			
糖尿病性腎症	1,712	66	1,778	11	977	2,766
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
SLE腎炎	40	2	42		20	62
(%)	(95.2)	(4.8)	(100.0)			
アミロイド腎	4		4		5	9
(%)	(100.0)		(100.0)			
痛風腎	22		22	1	10	33
(%)	(100.0)		(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	11	1	12	1	5	18
(%)	(91.7)	(8.3)	(100.0)			
腎・尿路結核	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎・尿路結石	13		13		3	16
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎・尿路腫瘍	9		9		5	14
(%)	(100.0)		(100.0)			
閉塞性尿路障害	13	1	14		8	22
(%)	(92.9)	(7.1)	(100.0)			
骨髄腫	5		5		3	8
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎形成不全	53	3	56		20	76
(%)	(94.6)	(5.4)	(100.0)			
不明	479	29	508	5	327	840
(%)	(94.3)	(5.7)	(100.0)			
再導入	32		32		19	51
(%)	(100.0)		(100.0)			
その他	147	7	154	1	94	249
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
合計	5,633	242	5,875	35	3,031	8,941
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	5,633	242	5,875	35	3,031	8,941
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査